



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ?
УЗНАЙТЕ НА САЙТЕ КЛЕЩАМ.НЕТ.РФ

ИЛИ ПОЗВОНИТЕ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»
КЛЕЩАМ.НЕТ: 8 800 707 73 36

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
РУЛС 002505 ОТ 16.09.2011 Г.

ЧТО ДЕЛАТЬ,




ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ?

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ, ГЛАВНОЕ - НЕ ПАНИКОВАТЬ, А ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ 3 ШАГА, ЧТОБЫ СВЕСТИ К МИНИМУМУ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ КЛЕЩЕВЫМ ЭНЦЕФАЛИТОМ:

1 СРОЧНО ИЗВЛЕЧЬ КЛЕЩА

 Немедленно обратитесь за помощью и консультацией в медицинское учреждение

Если нет возможности обратиться за медицинской помощью, срочно удалите клеща самостоятельно



Нитка



Выкручиватель



Пинцет

В случае отрыва головки или работы клеща на коже остается черная точка. Необходимо обработать ее йодом и оставить до естественного выхода.

Ранку необходимо обработать дезинфицирующей жидкостью

ПРИ УДАЛЕНИИ КЛЕЩА НЕЛЬЗЯ:



КАСАТЬСЯ КЛЕЩА
НЕЗАЩИЩЕННЫМИ
РУКАМИ



СДАВЛИВАТЬ
КЛЕЩА



МАЗЬТЬ МАЗЬМИ
НАСЫЩЕННЫМИ РАСТВОРАМИ
БЕЗИОНОВ И Т.Д.

2 СДАТЬ НА ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЕЩА И КРОВЬ

После укуса сразу сдайте клеща на исследование. Исследование крови проводится:

ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА

на наличие
антигена клещевого
энцефалита



ЧЕРЕЗ 21 ДЕНЬ

на наличие
антител к клещевому
боррелиозу

3

При получении положительного результата исследования клеща на вирус клещевого энцефалита, использовать для профилактики противоклещевой иммуноглобулин.

При невозможности использовать иммуноглобулин (отсутствие исследования клеща или крови, противопоказания, поздние сроки обращения) рекомендуется начать прием **ЙОДАНТИПИРИНА** по схеме экстренной профилактики:



ПОМНИТЕ, КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ (КЗ) – ЭТО ВИРУСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ ПОРАЖАЕТ ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ. ОСЛОЖНЕНИЯ ЭТОЙ ИНФЕКЦИИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПАРАЛИЧУ И ДАЖЕ К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ.

ЙОДАНТИПИРИН - препарат №1 в России для профилактики клещевого энцефалита. Это единственный таблетированный препарат с прямым показанием «профилактика и экстренная профилактика клещевого энцефалита».

Вакцинация взрослых

АДСМ (прививаться раз в 10 лет)

КОРЬ (сдать анализ на определение напряжённости иммунитета против кори, при показателе меньше 0,18 МЕ/мл прививаться)

ГЕПАТИТ В (группа риска до 55 лет, прививаться раз в 10 лет)

ПНЕВМОКОКК (группа риска до 60 лет, прививаться раз в 5 лет)

ГРИПП (прививаться раз в год)



Пункты экстренной профилактики клещевого энцефалита

приемное отделение № 2,
ул.Городская, 116, круглосуточно

приемное отделение № 3 (детство),
пр.Гагарина, 34, круглосуточно

травматологическое амбулаторное отделение № 1, ул.Вокзальная, 33, с 8:00 до 14:30

травматологическое амбулаторное отделение № 2, пр.Строителей, 7 круглосуточно

терапевтическое отделение № 3,
ул.Баргузинская 112 круглосуточно

поликлиника № 8, ул.Черных, 4 с 8:00 до 18:00

Схемы вакцинации от клещевого энцефалита

Традиционная схема(весенняя)

- 1 прививка Февраль-март
- 2 прививка Спустя месяц после первой
- 3 прививка Через 12 месяцев после второй

Традиционная схема(осенняя)

- 1 прививка Сентябрь-ноябрь
- 2 прививка Спустя 5-7 месяцев после первой
- 3 прививка Через 12 месяцев после второй

Ускоренная

- 1 прививка Апрель(перед началом сезона)
- 2 прививка Спустя 2 недели после первой
- 3 прививка Через 12 месяцев после второй





Прокопьевская
городская
больница

Вовремя
поставленная
прививка позволяет
сократить риски
возникновения
заболеваний!



Контакты:



(3846) 69 84 37



www.prkpgb.ru



prk_pgb@kuzdrav.ru



г. Прокопьевск,
ул. Подольская,
12



**Пройти
вакцинацию
МОЖНО**

в поликлинике по месту
жительства.